## 肝胆膵癌

## 2023/5/25更新

肝癌

(3) 1 7					
レジメン名	投与量	投与時間	投与日(#コース)	投与間隔	催吐リスク
Atezo+Bev療法	アテソ゛リス゛マフ゛(1200mg/Body)	60分	day1(#1)	21日	最小
		30分	day1(#2)		
	へ゛ハ゛シス゛マフ゛(15mg/kg)	90分	day1(#1)		
		60分	day1(#2)		
		30分	day1(#3~)		

胆道癌

レジメン名	投与量	投与時間	投与日(#コース)	投与間隔	催吐リスク
GC療法	シスプ <sup>°</sup> ラチン(25mg/ <b>m</b> <sup>®</sup> )	120分	day1•8	21日	MEC
	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/m²)	30分	day1•8		
BiweeklyGC療法	シスプ <sup>°</sup> ラチン(25mg/ <b>㎡</b> )	120分	day1•15	28日	MEC
	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/m²)	30分	day1•15		
Durva+GC療法	デュルバルマブ (1500mg/Body)	60分	day1	21日	MEC
	シスプ <sup>°</sup> ラチン(25mg/ <b>㎡</b> )	120分	day1•8		
	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/m²)	30分	day1∙8		
Durvalumab療法	テ <sup>゛</sup> ュルハ゛ルマフ゛(1500mg/Body)	60分	day1	28日	最小
GEM療法	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/m²)	30分	day1•8•15	28日	LEC*
BiweeklyGEM療法	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/m²)	30分	day1•15	28日	LEC*
GS療法	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/mឺ)		day1•8	21日	LEC*
	S-1 (80mg/ <b>m</b> ²/day)	1日2回	2週投与1週休薬		

膵癌

<u>加华7出</u>					
レジメン名	投与量	投与時間	投与日(#コース)	投与間隔	催吐リスク
GEM+nab-PTX療法	アフ <sup>゛</sup> ラキサン(125mg/ <b>㎡</b> )	30分	day1•8•15	28日	LEC*
	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/ <b>m</b> ²)	30分	day1•8•15		
BiweeklyGEM+nab-PTX療法	アフ <sup>゛</sup> ラキサン(125mg/ <b>㎡</b> )	30分	day1 • 15	28日	LEC*
	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/ <b>m</b> ²)	30分	day1•15		
GEM療法	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/m²)	30分	day1•8•15	28日	LEC*
BiweeklyGEM療法	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/ <b>m</b> ²)	30分	day1•15	28日	LEC*
GS療法	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/ <b>m</b> ²)	30分	day1•18	21日	LEC*
	S-1 (80mg/m²/day)	1日2回	2週投与1週休薬		
GEM+Erlo療法	ケ゛ムシタヒ゛ン(1000mg/ <b>m</b> ²)	30分	day1•8•15	28日	LEC*
	エルロチニフ゛(100mg/day)	1日1回	毎日		
mFOLFIRINOX療法	オキサリフ°ラチン(85mg/ $\mathbf{m}$ )	120分	day1	14日	HEC
	レホ゛ホリナート(200mg/m²)	120分	day1		
	イリノテカン(150mg/ <b>m</b> ²)	90分	day1		
	5-FU (2400mg/m²)	46時間	day1		
5-FU+LV+nal-IRI療法	オニバイド®(70mg/㎡)	90分	day1	14日	MEC
	レホ゛ホリナート(200mg/m²)	120分	day1		
	5-FU (2400mg/m²)	46時間	day1		