

食道癌

2024/1/31更新

レジメン名	投与量	投与時間	投与日(#コース)	投与間隔	催吐リスク
FP療法	シスプラチニ (80mg/m ²)	120分	day1	28日	HEC
	5-FU (800mg/m ²)	24時間	day1~5		
FP+Rt療法	シスプラチニ (75mg/m ²)	120分	day1	28日	HEC
	5-FU (1000mg/m ²)	24時間	day1~4		
	放射線(計50.4Gy)				
Low-doseFP+Rt	シスプラチニ (10mg/Body)	120分	5日連投(4投2休)	42日	MEC
	5-FU (1000mg/m ²)	24時間	5日連投(4投2休)		
DCF療法	ドセタキセル (75mg/m ²)	60分	day1	28日	HEC
	シスプラチニ (75mg/m ²)	120分	day1		
	5-FU (750mg/m ²)	24時間	day1~5		
Low-doseDCF療法	ドセタキセル (40mg/m ²)	60分	day1	14日	MEC
	シスプラチニ (10mg/Body)	120分	day1~5		
	5-FU (500mg/Body)	24時間	day1~5		
weeklyPTX療法	パクリタキセル (100mg/m ²)	60分	day1~36まで毎週	49日	LEC*
DTX療法	ドセタキセル (70mg/m ²)	60分	day1	21日	LEC*
Pembro+FP療法	ペムブロリズマブ (200mg/Body)	30分	day1	21日	HEC
	シスプラチニ (80mg/m ²)	120分	day1		
	5-FU (800mg/m ²)	24時間	day1~5		
Pembrolizumab療法	ペムブロリズマブ (200mg/Body)	30分	day1	21日	最小
Ipi+Nivo療法	ニボルマブ (240mg/Body)	30分	day1,15,29	42日	最小
	イピリムマブ (1mg/kg)	30分	day1		